

ID: 2011-07-8-T-1347

Тезис

Кязимов Тахир Рамазан оглы

Применение вამелана в комплексном лечении пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки*Ленкорань, Азербайджан*

С современных позиций, язвенная болезнь – полиэтиологическое, мультифакторное заболевание. Многочисленными исследованиями было доказано, что центральное место в этиологии и патогенезе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки принадлежит нарушениям нервной системы, возникающих в ее центральном и вегетативном отделах под влиянием различных воздействий, важная роль среди которых отводится психосоциальным и личностным. Дифференцированная оценка психосоматических аспектов болезни позволяет установить, в каждом конкретном случае, степень и направленность соответствующих психокоррекционных мероприятий.

Цель работы: изучение эффективности седативного фитопрепарата «вამелан» в комплексном лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

Под нашим наблюдением находились 220 больных с верифицированным диагнозом – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, в возрасте от 16 до 50 лет, с давностью заболевания от одного до десяти лет.

У больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки психосоматическая симптоматика была представлена ведущими синдромами: тревоги, депрессии, астении. Клиника заболеваний у всех больных была типична – симптомы неосложненной формы язвенной болезни и психосоматические нарушения в виде указанных синдромов.

Основную группу составили 120 пациентов, из них мужчин – 76 человек, женщин – 44 человека. Контрольную группу сформировали 100 человек, среди которых 76 больных – мужского пола, а 24 – женского пола.

Группа контроля получала лечение язвенной болезни по современным схемам. Пациентам из основной группы мы в комплекс лечебных схем включали седативный фитопрепарат «вამелан» (по 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды). Эффективность лечения оценивали по исчезновению или значительному уменьшению психосоматических нарушений.

У наблюдаемых лиц анализ полученных данных показал, что после лечения у 95% больных основной группы полностью исчезли, а у 5% – значительно уменьшились проявления психосоматических синдромов. В контрольной группе депрессивные, астенические и тревожные симптомы сохранялись более, чем у 70% больных.

Таким образом, мы рекомендуем включать препарат «вამелан» в комплексную терапию больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

Ключевые слова: вამелан, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки